

C. liukiensis (HAYATA) HARA リウきうだいげき

C. Makinoi (HAYATA) HARA こばのにしきさう

C. parannaquensis (BLANCO) HARA [*E. serrulata* (non THUILL. 1799) REINW.]

みやこじまにしきさう

C. Tashiroi (HAYATA) HARA のこばにしきさう (けこばのにしきさう)

C. thymifolia (L.) MILLSPAUGH (*C. mauritiana* COMMERS.) いりおもてにしきさう

又小笠原島デハしまにしきさうノ無毛品 *C. pilulifera* var. *glaberrima* HARA (*E. hirta* var. *glaberrima* KOIDZ.) ガ知ラレテキル。

Galarhoeus = 入ルベキモノハ

G. calonesiaca (CROIZAT) HARA たいわんたかとうだい

G. formosana (HAYATA) HARA きだちだいげき

G. Peplus (L.) HAWORTH きだちにしきさう、ちやばだいげき

G. tarokoensis (HAYATA) HARA [= *G. prolifera* (HAM.)] たろこたかとうだい

尙 *G. Esula* (L.) ノ組合セハ前川文夫氏ノ御注意ニヨリ RYDBERG ガ *Brittonia* I, p. 93 (1931) = 作ツテキルノヲ知ツタ。私ハ今迄ノ *Euphorbia* L. トイフ非常ニ多數ナ種ヲ含ミ、シカモ變化ニ富ンダ屬ノ新分類ガ CROIZAT ニヨツテ一日早ク確立サレル事ヲ希望スル。

(原 寛)

○ふらさばさう水戸ニ現ハル

Veronica hederæfolia L. ナルいぬのふぐり屬ノ一品ガ確カニ本邦内ニ於テ採集サレ、而モソレガ頗ル興味アル経緯ヲ持ツテ居ルモノデアル事ヲ本誌第十三卷十二號ニ報告シテ置イタ。ソシテ本種ノ再出現ヲ待望シテ居タ所デァツタガ、去ル2月13日茨城縣女子師範ノ鶴町猷氏ガ東京科學博物館へ來館サレテ示サレタ所ノいぬのふぐり屬ノ一品ハ正シク *V. hederæfolia* L. デ、日本ノ何處カニ生殘ツテ居ルデアラウト豫測シテハ居タ事ナガラ、九州ノ涯カラ遙カニ飛ンダ水戸ニ於テ昭和7年5月15日(水戸市外縁岡村)採集サレテ居タノダカラ愉快ナ事デ、實ニ田代氏ノ長崎ニ於ケル採集後20餘年ヲ經過シテ居ル事ニナル。斯クシテ本種ヲ歸化品ナリト斷定スル事ニ何ノ躊躇ノ必要モナクナツタ。而モ水戸ニ於ケル發見ハ益々本邦各地ニ期待出來ル可能性ヲ増加シタ事ニナル。以上一言喜ビノ報告マデ。ナホ其後ふらさばさうハ長崎駐在英國領事 F. C. GREATREX 氏ヨリ東大原寛氏ヘノ通信 “*Veronica hederæfolia*, young plants which I notice the farmers are finding troublesome, as they weed it out in large quantities.” ニヨレバ長崎ニハ今尙多量ニ産シ百姓ヲ困ラセル厄介千萬ナル雜草ノ由デアル。

(奥山 春季)

○あぶらちゃんノ稚苗ニ現レタ三裂葉

中井博士ガ滯歐中 Bull. Soc. Bot. France XXIV (1924) p. 1177-82 デ “*Parabenzoïn*, genus novum Lauracearum” ナル一文ヲ草サレ *Parabezoïn* NAKAI ナル一新屬ヲ設ケ、